

第2類医薬品

使用上の注意 **相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	軟便・便秘

2. しばらく服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期など
の場合の栄養補給

【用法・用量】

下記の量を回服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3錠	1～2錠
小児（15歳未満）	服用しないこと	

- 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 6錠（成人1日量）中

絨毛組織加水分解物	120mg
（プラセンタエキスとして400mg）	
チアミン硝酸物（ビタミンB1硝酸塩）	20mg
リボフラビン（ビタミンB2）	5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）	10mg
ニコチン酸アミド	25mg
ニンニクエキス	333mg
（原生薬換算2,000mg）	

*添加物として、セルロース、乳糖水和物、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、サッカリンNa水和物、カルナウバロウを含有します。

- 本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 品質保持のため、錠剤はぬれた手で扱わないでください。
- (6) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤保護様です。開封後は捨ててください。
- (7) 容器落下等による錠剤破損防止の為、外箱に入れて保管する等、取扱いにご注意ください。
- (8) 容器内の乾燥剤は食べられません。

【本製品についてのお問い合わせ先】

スノーデン株式会社

お客様相談室 電話03-3866-2459

受付時間8:50~12:00、13:00~17:30

(土・日・祝は除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

【製造販売元】

スノーデン株式会社

東京都千代田区岩本町3-7-16