プラセントップ液 ビタミン含有保健薬

第2類医薬品

【製品の特徴】

プラセンタエキス（胎盤成分）2000mg配合

プラセンタエキスには

・アスパラギン酸・トレオニン・セリン・グルタミン酸・グリシン・アラニン・バリン・メチオニン
・イソロイシン・ロイシン・チロシン・フェニルアラニン・リジン・アルギニン・プロリン
などのアミノ酸が含まれています。

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹
消 化 器	軟便

2. しばらく服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

- 滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1瓶（30mL）を服用してください。15歳未満は服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) よく振ってから服用してください。
(2) 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1瓶（30mL）中

絨毛組織加水分解物 600.0mg

（プラセンタエキスとして2,000mg）

チアミン硝酸塩（ビタミンB1硝酸塩） 5.0mg

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6） 5.0mg

ニコチン酸アミド 20.0mg

無水カフェイン 50.0mg

*添加物として、エリスリトール、スクラロース、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

本剤は生薬成分を配合していますので、まれに沈殿または浮遊を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【本製品についてのお問い合わせ先】

スノーデン株式会社

お客様相談室 電話03-3866-2459

受付時間9:30~11:30、12:30~16:30

(土・日・祝は除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独) 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

【製造販売元】

スノーデン株式会社

東京都千代田区岩本町3-7-16